REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE LA SANTE
SECRETARIAT GENERAL
PRONANUT
En collaboration avec
Le SNSA / Ministère de l'Agriculture et l'INS / Ministère du Plan

FEUILLET SNSAP Mois d'octobre 2020

RAPPEL DE LA METHODOLOGIE DU SNSAP

Le SNSAP est basé sur le suivi des indicateurs de nutrition collectés en routine (structures de soins) lesquels sont triangulés avec les données issues d'autres domaines et secteurs dont l'agriculture, l'économie (les prix), la surveillance épidémiologique, l'hygiène, l'eau et l'assainissement pour aider à comprendre globalement la situation nutritionnelle qui prévaut dans une zone de santé donnée.

Données collectées directement dans les structures des soins

-Le PB chez les enfants 6-59 mois
-Le PB chez les femmes allaitantes
-Le PB chez les femmes enceintes
-Les œdèmes chez les enfants
-Le poids à la naissance
-Le nombre d'admissions dans les structures de prise en charge de la malnutrition

TRIANGULATION

Données issues d'autres domaines et Secteurs (Economie, Santé, Agriculture)

- Surveillance épidémiologique (Rougeole, Diarrhée, Choléra)
- WASH (Eau, Hygiène, et Assainissement)
- Sécurité alimentaire (prix, production agricole, stratégies de survie, consommation alimentaire)
- Mouvement de population
- Autres faits saillants

Au cas où les indicateurs dépassent les seuils fixés pendant trois mois de suite, une alerte est déclarée. Ce feuillet présente la synthèse des données du mois d'octobre 2020 notamment en ce qui concerne la situation sur cinq indicateurs collectés dans les structures de soins. Il est à noter que les données d'une zone de santé prises isolément pour un mois, peuvent être considérées critiques lorsqu'au moins quatre indicateurs dépassent les seuils admis.

SITUATION SUR LE RAPPORTAGE DES DONNEES DU MOIS D'OCTOBRE 2020

Province	Nombre de sites sentinelles	Nombre de sites sentinelles ayant rapporté	complétude
Bas Uélé	18	18	100%
Equateur	28	28	100%
Haut Katanga	32	31	97%
Haut Lomami	24	23	96%
Haut Uélé	26	22	85%
Ituri	59	54	92%
Kasaï	35	35	100%
Kasaï central	31	23	74%
Kasaï oriental	28	28	100%
Kinshasa	70	50	71%
Kongo central	52	50	96%
Kwango	14	9	64%
Kwilu	30	20	67%
Lomami	21	19	90%

Province	Nombre de sites sentinelles	Nombre de sites sentinelles ayant rapporté	complétude
Lualaba	16	12	75%
Mai Ndombe	17	17	100%
Maniema	31	31	100%
Mongala	25	25	100%
Nord Kivu	67	66	99%
Nord Ubangi	18	18	100%
Sankuru	16	16	100%
Sud Kivu	68	64	94%
Sud Ubangi	30	30	100%
Tanganyika	16	16	100%
Tshopo	40	20	50%
Tshuapa	23	20	87%
TOTAL	**835**	**745**	**89,2%**

La complétude des données pour le mois d'octobre 2020 est de **89,2 %**. Cette complétude nationale cache cependant certaines disparités qui méritent des solutions urgentes. En effet, six provinces ont des complétudes de moins de 80%. Ces DPS sont : Tshopo (50%), Kwango (64%), Kwilu (67%), Kinshasa (71%), Kasaï Central (74%) et Lualaba (75%).
Pour le mois d'Octobre 2020, la Tshopo est la province qui enregistre la plus faible complétude, la moitié de ses sites n'ont pas rapporté les données (20 sites sur 40). Elle est suivie par la DPS du Kwango (64%). Des solutions durables devraient être envisagées pour redynamiser le SNSAP dans toutes les provinces qui présentent régulièrement des faibles taux de rapportage.

SITUATION DES INDICATEURS AU MOIS D'OCTOBRE 2020

59 ZONES DE SANTE SONT EN ALERTE : 55 ETAIENT EN ALERTE PAR LE PASSE ET 4 APPARAISSENT POUR LA PREMIERE FOIS

ZS avec 4 indicateurs hors normes et qui n'ont jamais été déclarées en alerte par le passé

N°	Province	Zone de santé	Valeurs des indicateurs				
			Proportion des enfants avec PB < 125 mm	Proportion des enfants avec œdèmes nutritionnels	Proportion d'enfants nés à terme avec un poids inférieur à 2,5 kg	Proportion de femmes enceintes avec un PB < 230 mm	Proportion de femmes allaitantes avec un PB < 230 mm
1	Kasaï Central	Bobozo	38%	32%	15%	21%	17%
2	Maniema	Kampene	23%	5%	14%	24%	15%
3		Kasongo	25%	6%	12%	15%	20%
4	Sankuru	Lomela	17%	6%	10%	20%	21%

ZS avec 4 indicateurs hors normes et qui ont eu à être en alerte par le passé

N°	Province	Zone de santé	Valeurs des indicateurs				
			Proportion des enfants avec PB < 125 mm	Proportion des enfants avec œdèmes nutritionnels	Proportion d'enfants nés à terme avec un poids inférieur à 2,5 kg	Proportion de femmes enceintes avec un PB < 230 mm	Proportion de femmes allaitantes avec un PB < 230 mm
1	Bas Uélé	Viadana	24%	6%	15%	25%	24%
2	Equateur	Bolenge	23%	0%	14%	26%	25%
3		Lilanga Bobangi	22%	0%	21%	23%	31%
4		Djombo	20%	0%	20%	22%	37%
5		Iboko	22%	0%	16%	24%	25%
6		Bikoro	22%	0%	17%	26%	33%
7		Ingende	21%	0%	13%	24%	31%
8		Irebu	21%	0%	27%	28%	40%
9		Lukolela	21%	0%	16%	28%	29%
10		Bolomba	22%	1%	15%	34%	26%
11		Lolanga Mampoko	23%	0%	16%	33%	33%
12	Haut Katanga	Mufunga Sampwe	23%	3%	13%	26%	24%
13		Mitwaba	35%	5%	7%	28%	26%
14	Haut Lomami	Kayamba	25%	4%	13%	24%	24%
15	Kasaï oriental	Muya	31%	7%	10%	35%	26%
16		Lukelelenge	26%	12%	16%	28%	19%
17		Nzaba	44%	7%	10%	44%	41%
18		Tshishimbi	23%	9%	14%	27%	14%
19		Miabi	24%	7%	4%	22%	22%
20		Kabeya Kamwanga	30%	8%	9%	22%	39%
21	Kwilu	Gungu	53%	13%	4%	57%	72%
22	Mai Ndombe	Pendjwa	22%	7%	15%	21%	21%
23	Kasaï Central	Benaleka	24%	14%	0%	27%	33%
24		Muetshi	20%	3%	27%	20%	22%
25		Kalomba	38%	6%	0%	30%	30%
26		Luiza	39%	2%	12%	49%	41%

27	Maniema	Kalima	32%	5%	19%	14%	22%
28		Kailo	24%	7%	22%	18%	25%
29		Samba	26%	6%	19%	21%	22%
30		Lusangi	26%	7%	14%	22%	16%
31		Lubutu	16%	6%	15%	22%	25%
32		Obokote	21%	6%	12%	23%	21%
33		Ferekeni	21%	7%	10%	24%	26%
34	Sankuru	Pania Mutombo	36%	15%	16%	22%	20%
35		Wembo Nyama	19%	5%	12%	23%	22%
36		Djalo Ndjeka	23%	3%	14%	21%	21%
37		Omendjadi	25%	5%	12%	26%	21%
38		Tshudi loto	24%	4%	13%	20%	26%
39		Kole	20%	3%	10%	23%	20%
40		Bena Dibele	23%	5%	11%	14%	23%
41	Sud Kivu	Kadutu	44%	10%	0%	23%	25%
42		Minembwe	32%	16%	50%	40%	50%
43	Sud Ubangi	Ndage	23%	1%	10%	21%	23%
44	Tanganyika	Ankoro	40%	8%	0%	43%	42%
45	Tshopo	Opienge	39%	12%	19%	22%	15%
46		Yahisuli	32%	9%	14%	23%	27%
47	Tshuapa	Mompono	20%	5%	12%	12%	21%
48		Bokungu	20%	6%	12%	4%	20%
49		Yalifafu	23%	8%	11%	12%	21%
50		Djolu	26%	9%	10%	14%	21%
51		Mondombe	23%	9%	13%	19%	23%
52		Monkoto	25%	8%	12%	18%	21%
53	Lualaba	Dilolo	21%	10%	6%	22%	26%
54		Kalamba	23%	7%	13%	30%	27%
55		Kapanga	19%	7%	27%	26%	23%

Points saillants à retenir pour le mois d'Octobre 2020

- ✓ Légère diminution du nombre des ZS en alerte, soit 59 ZS contre 63 ZS au bulletin SNSAP n° 41,
- ✓ 16 provinces sur les 26 ont au moins une zone de santé en alerte
- ✓ Les provinces de l'Equateur (10 sur 18 ZS), du Maniema (9 sur 18 ZS), du Sankuru (8 sur 16 ZS), du Tshuapa (6 sur 12 ZS), du Kasaï Oriental (6 sur 19 ZS), et du Kasaï Central (5 sur 26 ZS) regorgent presque 75% des alertes au cours du mois d'octobre 2020.
- ✓ Les Provinces de l'Equateur (10 sur 18 ZS), du Maniema (9 sur 18 ZS) et du Sankuru (8 sur 16 ZS) se hissent parmi les 3 Provinces les plus affectées
- ✓ Les plus faibles taux de rapportage sont observés au cours de ce mois dans les provinces de la Tshopo (50%) et du Kwango (64%).



Le Périmètre brachial ainsi que les œdèmes constituent les indicateurs clés du SNSAP.
Ces indicateurs sont obtenus suite aux mesures prises au niveau des consultations, notamment la CPN, la CPS et lors des consultations curatives.

En cette période de la pandémie du COVID-19 des ajustements spécifiques doivent être prises en ce qui concerne la prise du PB et des œdèmes en plus des mesures spécifiques d'hygiène et de distanciation sociale.

« Utiliser pour chaque enfant ou chaque femme une bande individuelle pour la mesure du PB (les familles gardent les bandes à la maison).
Le personnel de santé utilisera systématiquement des gants, et se lavera les mains après chaque prise de mesure anthropométrique et des œdèmes » .

Extrait du Manuel d'orientation sur la nutrition et la pandémie du COVID-19 en RD Congo

Ce feuillet est produit avec l'appui de :

Contacts
PRONANUT, 35 Av. Comité Urbain / Kinshasa Gombe
Site web : pronanutrdc.org
Youtube : PRONANUT RDC